

Ein Fall von Neuroma verum nervi optici.

Inaugural-Dissertation

der

medizinischen Facultät zu Greifswald

zur

Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und
Geburtshilfe

vorgelegt und vertheidigt

am 18. März 1874, 11 Uhr Vormittags

vom Verfasser

Rudolf Loch,

Pract. Arzt in Danzig

Opponenten:

1. H. Gerth, Cand. med.
2. F. Lorentz, Cand. med.
3. E. Schlüter, Cand. med.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Unter der verhältnissmässig grossen Zahl von Sehnervenschwülsten überhaupt, nehmen diejenigen, welche von dem intraorbitalen Stück des opticus ihren Ursprung nehmen, resp. sich auf dieses Stück beschränken, ohne auf das Auge oder auf das Gehirn überzugreifen, eine so kleine Stelle ein¹⁾, dass es mir vergönnt sein mag, einen dahin gehörigen Fall von tumor nervi optici zu veröffentlichen, den Herr Dr. Schneller in der Danziger Augenklinik am 16. October 1872 operirt hat, und der noch insofern ein hohes Interesse in Anspruch nehmen berechtigt ist, als er der einzige authentische Fall eines reinen Neuroms des opticus ist.

Anamnese. Marie Rogaschewska, 9 Jahre alt, ist in Mierschau i./Westpr. von armen, aber gesunden und kräftigen Eltern geboren und hat niemals eine bedeutendere Krankheit durchgemacht; auch ihre Geschwister erfreuen sich einer guten Gesundheit. Was das jetzige Leiden der R. betrifft, so lässt sich ein analoger, oder auch nur einigermaßen an die-
m erinnernder Fall in der ganzen Familie absolut nicht nachweisen. Im October 1870 erhielt Marie aus Unvorsichtigkeit mit einem eisernen Pumpenschwengel einen Schlag gegen das linke Auge. Es erfolgte sehr bald eine erhebliche Anschwellung der Lider, die von lebhaften Schmerzen begleitet war. Aber schon nach 14 Tagen liessen Schwellung und Schmerz nach, und nachdem einige Wochen verflossen waren, konnten die Eltern am linken Auge nichts Abnormes mehr konstatiren. Hingegen bemerkten sie im Januar 71, dass das Kind mit dem rechten Auge zu schielen anfange“ und zwar wich bei genauer Fixation eines Objects das rechte

¹⁾ Dr. Goldzieher (Gräfe's Archiv 1873. XIX. 3. pg. 119) hat nur Fälle in der Literatur gefunden, denen er 3 weitere anreicht; wir werden in der 2. Hälfte dieser Arbeit erheblich mehr finden.

Auge nach innen ab. Im Verlaufe der nächsten Monate fi es den Eltern auf, dass nicht nur die Einwärtsstellung d rechten Auges zugenommen hatte, sondern auch, dass d ganze rechte bulbus mehr prominent sei, als der linke. C das Kind in dieser oder vor dieser Zeit jemals Doppelbild gesehen, oder ob überhaupt damals noch Lichtempfindu auf dem rechten Auge vorhanden gewesen, darüber wiss die Eltern um so weniger etwas anzugeben, als sie no nach 1 $\frac{1}{2}$ Jahren ihre Tochter in dem Glauben nach Danz brachten, dass sie auf beiden Augen sehen könne. D Grund, weshalb sie sich überhaupt an Dr. Schneller wandte war der, dass der Exophthalmus rechterseits mittlerweile einem so bedeutenden Grade zugenommen hatte, dass dadur das Aussehen der Kleinen ungemein entstellt wurde. Ueb Schmerzen irgend welcher Art in dem rechten Auge oc über Kopfschmerzen hat P. nie geklagt, ebensowen über subjective Lichterscheinungen. Der Ernährungszust and das Allgemeinbefinden der Kleinen sollen während c letzten 2 Jahre keine erheblichen Differenzen gegen früh gezeigt haben.

Status praesens. R. ist ein gracil gebautes Kind, m intelligentem Gesichtsausdruck, bei dessen Betrachtung sofo eine bedeutende Hervortreibung des rechten bulbus nach inn unten auffällt, so dass der Scheitel der cornea den Orbita rand um 1 $\frac{1}{2}$ Ctmtr. überragt. Dennoch kann die Lidspa noch geschlossen werden, und zwar wird dieses dadurch c möglich, dass das obere Lid eine ziemlich beträchtlic Hyperplasie nebst Erweiterung der Gefässe zeigt. Die I weglichkeit des bulbus ist nach allen Seiten hin beschrän vorzugsweise nach aussen oben. Das Auge thränt nicht u verursacht der kleinen R. keine Schmerzen; auch selbst ziemlich energischem Fingerdruck, wobei es sich heraussto dass der bulbus nur wenig in die orbita zurückgedrängen werden kann, treten keine Schmerzempfindungen auf. Un den obern Orbitalrand kann man mit dem Finger zieml bequem eindringen und stösst dann sehr bald auf eine C schwulst mit fast halbkugliger Oberfläche, von prall elastisch Consistenz, welche mit ihrer grössten Circumferenz der orb

o anliegt, dass man sie nach hinten zu nicht umgreifen kann, und welche sich auch nicht in die Augenhöhle zurückrängen lässt.

Bei seitlicher Beleuchtung zeigt die conjunctiva bulbi sowohl, als tarsi keine abnorme Injunction, die cornea ist durchweg glatt und durchsichtig, die Iris nirgends adhärent; jedoch reagirt die mässig erweiterte Pupille auf Lichteinfall nicht. Sobald sich aber die linke Iris contrahirt, verengert sich gleichzeitig auch die rechte Pupille. Die Linse erscheint in ihrer ganzen Dicke durchsichtig.

Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel findet man im Glaskörper nichts Abnormes, hingegen zeigt die Papille eine trübe Schwellung mit stark geschlängelten Venen. Die Arterien sind fast garnicht zu sehen. Der übrige Augengrund bietet nichts Auffallendes dar, die retina liegt überall gut an.

R. hat auf dem rechten Auge absolut keine Lichtempfindung, das linke ist emmetropisch gebaut, seine Sehschärfe ist normal.

Am Halse finden sich einige ganz unbedeutende Anschwellungen von schmerzlosen Lymphdrüsen. Erscheinungen von Seiten des Cerebralsystems sind nicht vorhanden. Auch im ganzen übrigen Körper findet sich ausser einem leichten rechtsseitigen pes valgus congenitus keine Abnormität.

Diagnose. Ein relativ benigner tumor innerhalb des Muskeltrichters der rechten orbita, der wahrscheinlich mit dem Nerven zusammenhängt. Eine genaue Motivirung dieser Diagnose werde ich in der Epicrise im Zusammenhang geben.

Aetiologie. Da sich keine erbliche Anlage nachweisen lässt, da man das vorangegangene Trauma, welches das linke Auge betroffen, auch selbst mit Zuhilfenahme der kühnsten Combinationen unmöglich als ätiologisches Moment heranziehen kann, und da sich endlich auch sonst am Körper keine ähnlichen tumoren finden, so muss man in diesem Falle darauf verzichten, irgend eine Ursache des Leidens aufzufinden.

Prognose. Es sind noch nicht volle 2 Jahre verflossen, seitdem die ersten Anfänge des tumor an der Verdrängung des bulbus von den Eltern bemerkt wurden. Dennoch hat

er mittlerweile eine Grösse erreicht, welche hinreichend war den bulbus ganz bedeutend hervorzutreiben, und so lässt sich wenn man auch das Wachsthum kein rapides nennen kann mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass in nicht gar zu langer Zeit die Geschwulst innerhalb der orbita keinen Raum mehr finden und dann, sei es längs des opticus, sei es durch die fissura orbitalis superior hindurch in das Gehirn oder aber in den bulbus hinein wuchern resp. aus der fissura orbitalis inferior herausragen würde. Wenn nun auch die beiden letzteren Richtungen des Wachsthums von untergeordneter Bedeutung sind, so ist die Ausdehnung der Geschwulst nach der entgegengesetzten Seite hin aus naheliegenden Gründen um so misslicher. Da man aber kaum annehmen kann, dass sich die Geschwulst nur nach der günstigen Richtung hin verbreiten würde, so lässt sich die Prognosis in dem Falle, dass das Uebel sich selbst überlassen wird, kaum anders, als mala stellen. Ueber die Zeitdauer des Verlaufs lässt sich wol auch annäherungsweise kaum etwas vorhersagen, da ja bisweilen Cerebraltumoren relativ lange bestehen können, ehe der Tod eintritt. Ganz anders gestaltet sich die Prognose, wenn man eine rationelle

Therapie einschlägt. Es ist klar, dass überhaupt keine andere Therapie in Frage kommen kann, als die operative Beseitigung des tumor. Und in der That liegen hier die Verhältnisse so günstig, dass man nicht lange zu zögern braucht, um zum Entschluss zu gelangen. Die allseitige Beweglichkeit des bulbus, welche nur durch das Hervortreiben und die Spannung nach einigen Richtungen hin beschränkt ist, das Fehlen sämtlicher Gehirnsymptome, so wie das Freisein des andern opticus von jeglicher Affection, sprechen dafür, dass die Geschwulst noch innerhalb des Muskeltrichters ihren Abschluss findet und man kann demnach wol ziemlich bestimmt darauf rechnen, dass es gelingen wird, die Geschwulst in toto herauszupräpariren. Bei der Ausführung der Operation könnte es sich allenfalls noch darum handeln, ob der Versuch gemacht werden soll, den bulbus zu schonen und den tumor allein zu exstirpiren. Wie schon erwähnt, ist die Lichtempfindung des rechten Auges vollständig erloschen

und wenn man auch aus kosmetischen Rücksichten an eine Erhaltung des bulbus denken wollte, so müssten diese Rücksichten gegenüber der Frage über die Recidivirungsfähigkeit des tumor sehr bald weichen. Denn wenn wir auch angenommen, dass die Geschwulst wahrscheinlich nicht zu den bösartigsten Formen gehöre, so bleibt immerhin die unmittelbare Nachbarschaft des Gehirns eine so gefahrdrohende, dass sie allein schon hinreichend daran mahnt, die Entfernung der Neubildung sehr sorgfältig vorzunehmen, ohne sich durch unbedeutende Rücksichten beeinflussen zu lassen. Dazu kommt, dass bei der Diagnose mit Wahrscheinlichkeit ein Zusammenhang der Geschwulst mit dem opticus angenommen werden musste, wodurch die Entfernung derselben sammt dem intraorbitalen Stück des opticus, natürlich also auch sammt dem bulbus um so mehr indicirt ist. Um nun aber ein etwaiges Recidiv so sicher, wie irgend möglich zu vermeiden oder wenigstens hinauszuschieben, scheint es gerathen, den ganzen Inhalt der orbita zu entfernen, da ja immerhin Fortsätze der Geschwulst, die bei der Untersuchung nicht bemerkt wurden, in den Weichtheilen der orbita vorhanden sein und binnen Kurzem ein Recidiv bewirken können. Am geeignetsten erscheint demnach die von Snellen angegebene Operationsmethode, um den ganzen Orbitalinhalt zu exstirpiren.

Mit einem spitzen Scalpell wurde unter Chloroformnarkose vom innern Augenwinkel aus ein Schnitt durch Weichtheile und Periost hindurch bis auf den knöchernen margo infraorbitalis gemacht und längs des Orbitalrandes im Bogen herumgeführt, bis er an der Innenseite des margo supraorbitalis aufhörte, so dass zwischen Ausgangs- und Endigungspunkt eine Ernährungsbrücke von ca. $1\frac{1}{2}$ Ctmtr. stehen blieb. Darauf wurde mit einem kleinen Raspatorium das Periost innerhalb der ganzen orbita losgelöst, an den fissuren, wo es festhängt, mit einer Scheere kurz abgetragen, und endlich der n. opticus so dicht als möglich an seiner Eintrittsstelle in die orbita durchschnitten. Indem nun der ganze Inhalt der orbita herausgeholt und umgeklappt, und ein eiskalter Schwamm zur Stillung der Blutung in die orbita hineingeführt wurde, konnte der bulbus von seinen Verbindungen

mit den Lidern leicht abpräparirt werden. Nachdem die Blutung gestillt war, wurden die Wundränder des ursprünglich geführten Schnittes mit der nöthigen Anzahl Suturen wieder zusammengenäht.

Während der ganzen Operation war die Blutung nicht unbeträchtlich; es gelang aber ohne erhebliche Schwierigkeiten das ganze Periost vollständig abzuschälen, wie ich mich nach vollendeter Operation durch Eingehen mit dem Finger überzeugt habe. Da die kleine Patientin ziemlich anämisch und erschöpft aussah, wurde ihr etwas Wein eingeflösst, darauf die orbita, um einer eventuellen Nachblutung möglichst vorzubeugen, mit Charpie ausgestopft und ein leichter Compressivverband darüber angelegt.

Krankheitsverlauf.

16. 10. Etwa 1 Stunde nach beendigter Operation tritt als Nachwirkung der Chloroformnarcose ziemlich reichliches Erbrechen ein. Abd. Tprt. 38,2. Da der Verband mit Blut durchtränkt ist, so wird er erneuert; keine Schmerzen.

17. 10. Mrgs. Tprt. 37,9. R. hat die Nacht ruhig zugebracht; Allgemeinbefinden gut, keine Kopfschmerzen. Da die in die orbita eingeführte Charpie wieder mit etwas Blut durchtränkt ist, so wird frische eingelegt. Abd. Tprt. 38,5. Der Verband bleibt.

18. 10. Mrgs. Tprt. 38,0. Die Charpie ist mit etwas übelriechendem Eiter durchfeuchtet; sie wird entfernt, die orbita mit sol. acid. carbol. 1/100 ausgespritzt und frisch ausgestopft. An der Lidwunde werden einige Suturen entfernt. Abd. Tprt. 39,1. Allgemeinbefinden gut.

19. 10. Mrgs. Tprt. 38,1. Der üble Geruch des Eiters hat zugenommen; es wird deshalb die orbita sorgfältig mit der Carbolsäurelösung ausgespritzt und nicht wieder mit Charpie vollgefüllt, sondern nur mit einem Oelläppchen bedeckt. Die letzten Näthe werden entfernt.

Abd. Tprt. 38,5.

In den nächsten Tagen wurde die orbita täglich 2mal ausgespritzt; der üble Geruch des Eiters liess bald nach, die orbita reinigte sich unter Abstossung von kleinen gangränösen

sen Fetzen immer mehr. Die Temperatur überstieg nie mehr die Höhe von 38,5, meist war sie niedriger. Das Allgemeinbefinden der Kleinen war dauernd gut, ebenso der Appetit. Kopfschmerzen sind gar nicht aufgetreten, ebensowenig andere Erscheinungen von cerebraler Reizung.

26. 10. Die Wundränder an den Lidern sind bis auf eine kleine Stelle am äussern Augenwinkel und eine am obern Lid per primam verheilt; die orbita ist ganz frei von gangränösen Fetzen; in der Tiefe der Augenhöhle sowohl, als an den Seiten sieht man reichliche Granulationen aufschliessen. Die P. ist einige Stunden des Tages ausser Bett, die Temperatur normal.

Die Ausspülungen der orbita mit sol. acid. carbol. wurden fortgesetzt, die Granulationen behielten constant ein frisches, gutes Aussehen.

31. 10. An dem obern Lid ist die kleine klaffende Stelle noch nicht verheilt; in der orbita sieht man sowohl innen als aussen an einer Stelle noch Knochen blos liegen.

9. 11. Die Lidwunde ist verheilt; an den beiden blosliegenden Stellen in der orbita hat sich eine oberflächliche Knochenschicht abgestossen und es spriessen jetzt auch hier Granulationen hervor. Der übrige Theil der Augenhöhle füllt sich allmählig immer mehr.

P. wurde nun noch bis zum 23. 1. 73 in der Klinik behalten, während welcher Zeit die orbita zum grössten Theil mit Granulationen ausgefüllt wurde, die aber nur an einzelnen Stellen Neigung zur Vernarbung zeigten, während sie an den meisten noch immer Eiter absonderten. Es wurde deshalb den Eltern eine sorgfältige Reinigung an's Herz gelegt und die Kleine recht wohl aussehend in ihre Heimath entlassen. Von Recidiv keine Spur; die geringen Lymphdrüsenanschwellungen am Halse sind nicht mehr nachzuweisen.

Am 6. 2. stellte sie sich wieder vor. Der grösste Theil der Granulationsmassen war vernarbt, nur aussen sonderten noch einzelne Stellen ein geringes Secret ab. Den 30. 3. sah ich sie zum letzten Mal; die Granulationsfläche war vollständig vernarbt, kein Recidiv nachweisbar. Das Allgemeinbefinden der Kleinen liess Nichts zu wünschen übrig.

Da mir der Fall, nachdem wir die Geschwulst mikroskopisch untersucht, ein besonderes pathologisch-anatomisches Interesse darzubieten schien, so schickte ich den bulbus sammtumor an den Assistenten des pathol.-anatom. Instituts zu Königsberg Herrn Dr. Perls und erlaube mir, seinen Befund hier anzuführen:¹⁾

„Neuroma verum nervi optici. Die eiförmige vornestumpf den Opticus-Eintritt übergreifende, nach hinten sich zuspitzende Geschwulst hat einen Längendurchmesser von 35 mm., grössten Breiten- und Höhendurchmesser von 24 mm. Sie stösst vorne an die sclerotica dicht an, ist überall von einer derben glatten Bindegewebskapsel (der äussern Opticus-scheide) umgeben, die vorne continuirlich in die sclera übergeht. Sie liegt grösstentheils der Geschwulst dicht auf, lässt sich aber überall von ihr leicht abpräpariren, nur am vorderen und hinteren Ende ist sie von der Oberfläche der Geschwulst durch ein reichlicheres, lockeres Bindegewebe getrennt. Die Geschwulst ist dann ausserdem noch von einer mit ihr vollständig continuirlichen zarten Bindegewebslage gedeckt (der innern Opticusscheide) deren Oberfläche nicht glatt sondern mit Zellgewebsanhängen unregelmässig besetzt ist. Unterhalb des hinteren Pols lässt sich noch auf eine Strecke von fast 1 Ctmtr. das hintere Ende des opticus präpariren das von beiden Scheiden eingehüllt ist, glatt und dünn erscheint und sich in die Geschwulst verliert. Der gleich nach der Enucleation gemachte verticale Längsschnitt durch die Geschwulst, welche dann in Müller'scher Flüssigkeit conservirt wurde, zeigt die peripheren Parteen der Geschwulstmasse über die Kapsel stark vorgequollen und von unregelmässiger grobkörniger, opaker, weicher Beschaffenheit mit gelbbrauner Färbung, während in der vorderen Hälfte wenigstens sich eine etwa dem Opticusverlaufe entsprechende mehr im unteren Theile der Geschwulst gelegene Partie durch eine weniger prominirende, festere, feinkörnig-faserige Beschaffenheit und mehr ins Graugrünliche spielende Färbung markirt. De

¹⁾ Eine genauere Beschreibung nebst Abbildungen findet sich in Gräfe's Archiv 1873 XIX. 2. pg. 287—302.

Opticus nämlich, der an der lamina cribrosa einen Durchmesser von 1,5 mm. hat, verbreitert sich sehr schnell, so dass er schon 4 mm. hinter der lamina cribrosa 7 mm. Durchmesser hat. Hier setzt er sich noch überall von der grobkörnigen Geschwulstmasse, die ihn schon dicht hinter dem Bulbus nach oben um 12 mm., nach unten um $3\frac{1}{2}$ mm. überträgt, dem Aussehen nach scharf ab, ist aber von derselben durch kein dazwischen liegendes Gewebe getrennt; 6 mm. hinter der lamina cribrosa hört die scharfe Grenze auf. Sein weiterer Verlauf ist zwar noch durch jene festere, mehr faserige Beschaffenheit gekennzeichnet, aber die beiden verschiedenartigen Substanzen greifen unregelmässig und diffus ineinander über. Auf einem Querschnitte durch die Mitte der Geschwulst zeigt ein rundlicher nicht scharf abgegrenzter Abschnitt von 13 mm. Durchmesser, der nach unten bis fast an die Kapsel geht, oben 8 mm. von ihr entfernt bleibt, jene festere, mehr feinkörnige Beschaffenheit. Halbirt man ferner den ursprünglichen Längsschnitt durch einen dem Verlaufe des hinteren Opticus-Endes entsprechenden, so lässt sich dieser längs der untern Grenze der Geschwulst als 2—3 mm. breiter, parallel faseriger Streifen bis fast zur Mitte der Geschwulst verfolgen; nach oben und zur Seite gehen federkielartig reichliche, faserige, von feinen opaken Körnern durchsetzte Streifen aus, zwischen denen unregelmässige, von jener weicheeren, grobkörnigen Substanz ausgefüllte Parteen liegen. Von der Mitte der Geschwulst an etwa heben sich die festesten Züge mehr von der untern Fläche ab.

Dieser macroscopische Befund ergibt also, dass die Geschwulst dem opticus selbst angehört, dieser in sie ohne Grenzen übergeht. Damit stimmt nun das Ergebniss der microscopischen Untersuchung, die an jedem Schnitte mit Leichtigkeit nachweisen lässt, dass die Geschwulst fast nur aus nervösen Elementen besteht, und dass es sich also hier wirklich um ein wahres Neurom — eine Geschwulstart, deren Vorkommen am opticus nach den bisherigen Beobachtungen geläugnet werden musste — handelt. Vorbehaltlich einer anderweitigen, genaueren Detaillirung des histiologischen Befundes will ich hier nur hervorheben: 1) dass jene grob-

körnigen Partieen vorwiegend aus einem Gewirre breiteren grauer und markhaltiger Nervenfasern bestehen, die streifig-feinkörnigen dagegen grösstentheils marklose Nervenfasern und diese in dichterem streifiger Anordnung enthalten; 2) dass das hintere Ende des opticus und jener ihm zukommende Streifen in der hintern Partie der Geschwulst vollständig marklos sind; 3) dass überall zwischen den nervösen Elementen reichlich Zellen sich finden, die alle Uebergänge von jenen kleinen, runden Gebilden, wie sie normaler Weise zwischen den Nervenfasern des opticus vorkommen, zu grossen spindel-, sternförmigen und ganglienzellenartigen Gebilden zeigen, und dass, namentlich in jenen grobkörnigen Partieen die Nervenfasern wenigstens zum Theil Fortsätze dieser zelligen Gebilde sind.“

Epicrise.

Wenn wir uns zunächst die Frage vorlegen, in wie weit es möglich war, eine präzise Diagnose zu stellen, so konnte man eine relativ gutartige Geschwulstform mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, indem hier die hauptsächlichsten Punkte eintrafen, welche v. Gräfe¹⁾ als charakteristisch dafür anführt: 1) „Das Freisein der Musculatur“, so weit die Bewegungsbeschränkungen nicht rein mechanisch durch die Geschwulstlage bedingt werden. Die Bewegungen waren in unserm Falle nach allen Seiten hin behindert, am meisten nach oben aussen, entsprechend der Lage der Geschwulst, welche rund herum um den opticus sass, am meisten jedoch nach oben aussen, wo schon durch die natürliche Formation der orbita der meiste Platz zur Entwicklung der Geschwulstmassen vorhanden ist. Der opticus nähert sich nämlich in seinem Verlauf innerhalb des Muskeltrichters der orbita am meisten der innern untern Wand und theilt so die ganze Augenhöhle in 2 ungleiche Hälften, deren grössere über ihm liegt. Es ist demnach natürlich, dass Geschwülste, welche vom opticus ausgehen, sobald sie eine ent-

¹⁾ v. Gräfe's Archiv. 1864 pg. 194.

sprechende Grösse erreicht haben, hauptsächlich den obern äussern Theil der orbita einnehmen. 2) „Das Fehlen aller Schmerzen.“ 3) „Das Alter und das blühende Aussehen des Patienten.“ Wenn unsere P. auch nicht gerade blühend aussah (und dies lag in ihrer ganzen Constitution), so machte sie doch durchaus keinen kachectischen Eindruck.

Die microscopische Untersuchung hat ein Neurom ergeben und Virchow (Geschwülste III. 1. pg. 289) sagt darüber: „Das wahre Neurom ist nach unseren bisherigen Erfahrungen eine wesentlich locale und gutartige Geschwulst.“ Es stimmt dies demnach mit unserer Diagnose überein.

Der Zusammenhang mit dem opticus konnte sowohl aus der palpibaren Lage der Geschwulst und der relativ freien Beweglichkeit des bulbus, als auch daraus vermuthet werden, dass, obgleich dieselbe noch nicht volle 2 Jahre bestand, dennoch (vielleicht schon sehr frühzeitig?) totale Amaurose eingetreten war, während bei einfacher Compression des Sehnerven durch einen neben ihm sich entwickelnden tumor oder durch Geschwulstmassen, welche die Sehnervenfasern auseinander drängen, ohne sie zu zerstören, meist einiges Sehvermögen (wenigstens quantitative Lichtempfindung) so lange erhalten bleibt, bis allmähig Atrophie der Papille eintritt, wie z. B. in einem Fall von Sarcoma myxomatodes des Sehnerven, welchen v. Gräfe¹⁾ mittheilt, noch 6 Jahre nach aufgetretenem Exophthalmus, der damals schon so bedeutend war, dass die Lider nicht mehr geschlossen werden konnten, Handbewegungen gesehen wurden. Man konnte demnach hier, wo die Papille nur eine geringe Schwellung darbot und dennoch vollständige Amaurose bestand, wol annehmen, dass die Massen des Neoplasma in innigem Zusammenhang mit den Sehnervenfasern selbst ständen und so durch Degeneration dieser die schnelle Erblindung herbeigeführt hätten. Der pathologisch anatomische Befund hat nun ergeben, dass die Nervenfasern des opticus direct in die Geschwulst übergriffen und besonders am hintern Abschnitt des Sehnerven gewisser-

1) v. Gräfe's Archiv 1864. pg. 201.

massen ein Ganzes mit ihr bildeten. Wenn daher Virchow¹⁾ mit Bezug auf die wahren Neurome sagt: „Die Zahl der nervösen Theile vermehrt sich und ein Motiv der Unterbrechung der Leitung oder der Thätigkeit liegt an sich nicht vor; im Gegentheile sollte man eher eine vermehrte Thätigkeit erwarten“ und dann weiter zugiebt, dass dies bis jetzt erst in Beziehung auf sensitive Functionen bestätigt wäre (*tubercula dolorosa* etc.), so gestalten sich die Verhältnisse am *opticus* ganz anders: Während bei den peripherischen Nerven die Leitung trotz des Neurom's sehr wohl erhalten bleiben kann und höchstens durch Zerrung und Reizung der Nervenfasern Schmerzen hervorgerufen werden, bietet zunächst die feste Scheide des *opticus* dem Wachsthum des Neurom's einen so energischen Widerstand, dass die Geschwulstmassen, noch ehe sie diesen Widerstand überwunden haben, unmittelbar die leitenden Nervenfasern comprimiren müssen. Im weiteren Verlauf setzt die knöcherne *orbita* dem Wachsthum wieder ein Hinderniss in den Weg und hilft die Compression der *Opticusfasern* vermehren. Durch diesen Druck aber, welcher den Sehnerven trifft, leidet secundär die Ernährung der Netzhaut, wie auch in unserem Falle das Oedem der Papille, die geschlängelten Venen, die auffallend engen Arterien es unzweifelhaft machen, dass sowohl Blut- als Lymphbewegung innerhalb der Netzhaut ungemein behindert waren.

Wollte man die Diagnose durch Exclusion noch genauer präcisiren, so hätte man von relativ gutartigen Geschwülsten, die sonst noch am *opticus* beobachtet sind, ganz entschieden eine Cyste, so wie ein Aneurysma der *a. centralis retinae* aus naheliegenden Gründen ausschliessen können. Zu erklären wäre allenfalls noch, weshalb die rechte Pupille sich nur synchronisch mit der linken verengerte; jedoch liegt es auf der Hand, dass bei vollständig aufgehobener Lichtempfindung wie es hier auf dem rechten Auge der Fall war, jede Anregung zur Contraction der Iris fehlt, während diese in gewohnter Weise auf einen Lichtreiz, welcher das linke Auge trifft, mit antwortet. Diese Erhaltung der Contractionsfähigkeit der

1) Virchow: Die krankhaften Geschwülste III. 1. pg. 298 u. 99.

Iris hätte übrigens sehr wol als Anhaltcpunkt für die Annahme dienen können, dass die übrigen Orbitalnerven von der Geschwulstmasse nicht mit ergriffen seien, mithin dieselbe sich höchst wahrscheinlich nur auf den opticus beschränke. So viel über die Diagnose.

Was die Prognose anbetrifft, so kann man wol, da noch nie ein Neurom des opticus beobachtet ist, mit Bestimmtheit nicht voraussagen, wie der Verlauf ohne Operation geworden wäre; aber es erscheint ungemein wahrscheinlich, dass die Geschwulst allmählig die ihr am meisten verwandten Gewebe ergriffen hätte, also in erster Reihe das Gehirn, so dass man auch nachträglich bei der von vorne herein gestellten Prognose verbleiben kann. Ueber ein noch zu erwartendes Recidiv kann man wol kaum Etwas voraussagen. Jedenfalls ist durch die Operation, wie aus dem pathol.-anatomischen Befund hervorgeht, die Geschwulst so rein exstirpiert, dass hinter ihr sich noch ein 1 Ctmtr. langes Stück des normalen opticus befindet; mithin ist Alles geschehen, was man zur Verhütung resp. Hinausschiebung eines Recidiv's thun kann.

Dass die Therapie eine durchaus rationelle gewesen ist, geht unter Anderem auch aus folgender Aeusserung Virchow's¹⁾ über das Neurom hervor: „Da eine spontane Resolution ebensowenig vorkommt, als sonst durch irgend ein Mittel eine Heilung beobachtet ist, so bleibt nur die chirurgische Hilfe“. Nur hätte man, wenn man die Diagnose so genau gestellt hätte, wie oben angedeutet, die Musculatur und das Periost ruhig in der orbita lassen können, so dass es genügt hätte, die Lidspalte nach aussen zu erweitern und dann erst den bulbus in gewöhnlicher Weise zu enucleiren, um darauf die Exstirpation des tumor folgen zu lassen. Jedenfalls wäre dann die Heilung schneller erfolgt, indem einmal der Orbitalinhalt nicht so erheblich vermindert worden wäre, wie es jetzt geschehen ist, und zweitens die Granulationen schneller hervorgesprosst wären, als vom blossen Knochen aus.

Die Frage, ob man einen oculus artificialis tragen lassen solle, würde man, abgesehen von dem Bedenken, dass durch

¹⁾ Virchow: „Die krankhaften Geschwülste“ III. 1. pg. 303.

den Reiz, welchen das künstliche Auge ausüben würde, ein eventuelles Recidiv befördert werden könnte, schon deshalb verneinen müssen, weil das obere Lid, welches schon vermöge seiner Ausdehnung stark herabhing, nun, nach Durchschneidung des m. orbicularis und palpebrae superioris um so mehr die Lidspalte vollständig verschliesst. Ausserdem würde das künstliche Auge bei dem äusserst geringen Orbitalinhalt und dem gänzlichen Fehlen der Musculatur in der Augenhöhle sehr wenig Halt haben und unbeweglich sein.

Wenn wir uns in der Literatur umsehen, so finden wir nirgends einen Fall, welcher dem unsrigen analog wäre. Denn die von Virchow (die krankhaften Geschwülste Bd. III pg. 270) angeführten Beobachtungen einzelner Forscher über Nervengeschwülste, welche mit dem Chiasma n. opt. oder mit den Thalami optici in Zusammenhang standen, beurtheilt er selbst folgendermassen: „Wenn ich auch in keiner Weise bestreiten will, dass wirklich nervöse Partialhyperplasien vorkommen mögen, so sind doch meiner Ansicht nach die bisherigen Untersuchungsmethoden noch nicht sicher genug, um zu einem definitiven Urtheil zu berechtigen.“ Auch der Fall von Opticusneurom, welchen Arlt in seinem Lehrbuch anführt, ist wie aus der Beschreibung selbst hervorgeht, nach unsern jetzigen Begriffen kein wahres Neurom. Arlt erzählt folgendermassen: „Böhm (das Schielen und der Sehnenschnitt Berlin 1845. S. 448) fand bei einem an Lungenschwindsucht gestorbenen 19jährigen Jünglinge, dessen rechtes Auge vom 6. Lebensjahre an nach aussen und oben abgelenkt, allmählich aus der orbitaorgetreten und zwar amblyopisch, jedoch durchaus nicht amaurotisch gewesen war, den Sehnerven um das Mehrfache verlängert und zu einem spindelförmigen Neuroma angeschwollen (nach der Zeichnung gegen 2 Zoll lang und an $\frac{3}{4}$ Zoll dick). Nur der vorderste, dem bulbär zunächst befindliche Theil erschien eine kurze Strecke vor

¹⁾ Arlt: „Die Krankheiten des Auges“ Bd. III. pg. 143. Derselbe Fall führt Demarquay an: „Tumeurs de l'orbite pg. 504, wobei er noch ausdrücklich anführt: „la substance nerveuse n'était point altérée.“ Auch Mackenzie (frz. Uebers. v. Warlomont) II. pg. 799 erwähnt den Fall.

natürlicher Beschaffenheit, ebenso der hinterste nächst dem gleichfalls normalen Chiasma. Die weisse, spindelförmige, namentlich in der Peripherie hart anzufühlende Nervengeschwulst sah auf dem Querdurchschnitt fein maschenartig aus und bestand wesentlich aus dem verdickten Neurilem. Durch die microscopische Untersuchung liessen sich noch bestimmter in die Geschwulst eintretende Nerve und die krankhaft vermehrten fibrösen Fascikeln des Neurilem's unterscheiden, deren dichteres Gewebe nach dem Umfange der Geschwulst hin die Oberhand gewann.“

Deshalb sagt Virchow (Geschwülste Bd. III. 1. pg. 298) ganz bestimmt: „Am opticus ist mir bis jetzt kein Fall vorgekommen, welcher auch nur die Vermuthung einer wahren Neurombildung erregt hätte. Auch die andern Beschreibungen der Literatur¹⁾ sprechen wenig dafür, dass die selbstständigen Opticusgeschwülste hierher gehörten. Ich kann mich daher der Angabe von Rokitansky²⁾, dass das Neurom „mit Ausschluss des Olfactorius, Opticus und Acusticus“ an allen Nerven vorkomme, in Beziehung auf die beiden ersteren Nerven anschliessen, während ich ihm in Beziehung auf den letzteren entgegentreten muss.“

Diese Angabe von Rokitansky und Virchow wird also Folge unseres vorher geschilderten Falles dahin modificirt werden müssen, dass bis jetzt das Neurom an allen Nerven beobachtet sei, mit Ausschluss des Olfactorius, wobei man natürlich die Frage offen lässt, ob nicht später auch noch an Olfactorius ein wahres Neurom gefunden wird.

Unter den andern Geschwülsten, welche wiederholt am traorbitalen Stück des Sehnerven beobachtet sind, stehen die Neurome am nächsten

I. Die Myxome.

Nach Virchow³⁾ treten sie an den peripherischen Nerven

¹⁾ Voigtel. Path. Anat. Bd. I. S. 679. Sédillot. Journ. de méd. 14. Août pg. 380. J. Wardrop. Essays on the morbid anatomy of the human eye. Lond. 1818. Vol. II. pg. 273. Pl. XV. Fig. 1. Schön. Path. Anat. des menschlichen Auges. Hamb. 1828. S. 200. Heymann. De neuromate nervi optici. Diss. inaug. Berol. 1842.

²⁾ Rokitansky. Lehrbuch der path. Anat. 1856. Bd. II. S. 501.

³⁾ Virchow: „Die krankhaften Geschwülste“ I. pg. 425.

in Form von falschen Neuromen auf, zeigen aber ganz ähnliche Formen, wie die wirklichen Neurome; der Nerv, davon befallen wird, treibt an einer Stelle spindelförmig an oder er schwillt mehr kugelig oder knotig an. Ausgezeichnete Beispiele dieser Art habe ich am opticus innerhalb der Orbita¹⁾ gesehn.“

Die beiden Fälle, welche v. Gräfe²⁾ beschrieben und welche Virchow hier meint, sind folgende:

Fall 1. Im Februar 1863 kam zu v. Gräfe ein junger Landmann mit einem so bedeutenden rechtsseitigen Exophthalmus, dass die Protrusion des bulbus mindestens 9''' betrug, weshalb die Lider nicht mehr geschlossen werden konnten. Die Palpation ergab eine retrobulbäre, elastische, weiche, an einigen Stellen fast fluctuirende Orbitalgeschwulst. Die Lichtperception war aufgehoben. Bei der ophthalmoscopischen Untersuchung erschienen die Venen geschlängelt, die Arterien dünn; die innere Hälfte der Papille zeigt eine eigenthümlich steile Anschwellung.

Es wurde erst der bulbus enucleirt, dann der etwa taubeneigrosse tumor, welcher gegen das foramen opticum hin spitzer wurde und nur wenige Linien vor diesem endigte, exstirpirt.

Die pathologisch-anatomische Untersuchung der Geschwulst durch Prf. v. Recklinghausen ergab, wie aus der genaueren Beschreibung derselben hervorgeht, „dass ein Myxom vorlag, welches vom N. opticus ausgegangen war, ja wahrscheinlich sich innerhalb der Scheide desselben entwickelt hatte.“

Die eigenthümliche Anschwellung der Sehnervenpapille stellte eine noch ziemlich indifferente Zellenwucherung dar, „Möglicherweise“, sagt von Gräfe, „würde dieselbe noch als eine einfache locale Irritation aufzufassen sein, welche der Vorläufer einer intra-ocularen Ausbreitung der Geschwulst gebildet.“

Fall 2. Frl. O. consultirte 1858, 19 Jahre alt, v. Gräfe, welcher eine linksscitige Neuroretinitis, die der bei intrac

1) Im Jahre 1863 von Herrn v. Gräfe exstirpirt. Vgl. den Bericht von Breschet bei Gluge. Anat. mikr. Unters. II. S. 133.

2) Gräfe's Archiv f. Ophthalmologie Bd. X. 1. 1864. pg. 193 u. ff.

niellen Tumoren vorkommenden ähnlich war, nebst einer Protrusion des linken Augapfels von ca. 2''' feststellte. Schon damals vermuthete er einen beginnenden Orbitaltumor. Im Sommer 1863 betrug die Hervordrängung fast 8'', die Bewegungen des bulbus waren wenig behindert. „Eine retrobulbäre Geschwulst von gleichmässig weicher Consistenz sass innerhalb des Muskeltrichters.“ Das Sehvermögen war auf quantitative Lichtempfindung reducirt; das Allgemeinbefinden gut.

Langenbeck operirte ebenso wie v. Gräfe im Fall 1. Prof. v. Recklinghausen untersuchte die Geschwulst und erklärte sie „für ein Sarcom mit partieller schleimiger Umwandlung und Gefässbildung, ausgehend vom N. opticus“.

Der bulbus war durch den Gegendruck von der orbita stark abgeplattet, so dass er hinten fast mit einer ebenen Fläche von 7'' Durchmesser abschloss.

An diese beiden Fälle schliesst sich unmittelbar eine Beobachtung von A. Sichel¹⁾ an: (Gaz. hebdom. N. 8 et 9 1871, 24 Mars et 7 Avril.)

Ein 16jähriges Mädchen, im Uebrigen gut entwickelt, litt an einem linksseitigen Exophthalmus, welcher sich innerhalb 9 Jahren so bedeutend entwickelt hatte, dass die jetzige Prominenz des bulbus (Juli 1867) 15—16mm. betrug. Die Beweglichkeit desselben war trotzdem relativ gut erhalten. Bei genauer Palpation, welche nicht besondere Schmerzen verursachte, „on reconnait“ (sc. en arrière du globe) „alors la présence d'une tumeur bosselée, élastique, vaguement fluctuante.“ Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel „on a devant les yeux exactement la même image que dans les cas d'atrophie de cause cérébrale ou médullaire. On ne voit aucune trace de névro — rétinite ayant précédé cet état.“ Die Sehschärfe war = 0.

Die Operation wurde so ausgeführt, dass nach Erweiterung der äussern Commissur durch einen Schnitt zuerst der Versuch gemacht wurde, den tumor allein ohne bulbus zu

¹⁾ Mitgetheilt durch Warlomont in Annales d'oculistique. Tome LXV. 10e série. T. 5. 1871. pg. 279. Referirt ist derselbe Fall unter dem Titel: „Myxoma of the optic nerv“ in Ophthalmic Hospital Reports. Novb. 1871. pg. 272.

exstirpiren. Da es sich jedoch herausstellte, dass die Geschwulstmassen die Muskeln ganz durchsetzten, so wurde der ganze Inhalt der orbita entfernt.

Man sah den opticus genau in der Mitte der Hühner grossen Geschwulst, welche „la consistance d'une forte solution de gélatine“ hatte. Nach der microscopischen Untersuchung, il s'agit même ici d'un myxoma hyalinum sive gelatinosum, qui, en quelques petits points passe même à l'état myxoma lipomatodes.“

Bis August 1870 erfolgte kein Recidiv; die P. befand sich vollständig wohl.

Einen schlimmern Ausgang sah Prof. A. Quaglino¹⁾ Mailand bei einem 24jährigen Mädchen, welches 5 Jahre vorher sich eine Verletzung des rechten Auges durch Hinfallen auf einen Baumstumpf zugezogen hatte, worauf nach 1 Monat Sehschwäche, Doppelsehn und ein geringer Exophthalmus eintrat. Im Jahre 1867 fand man den bulbus nur wenig vorgetrieben, seine Bewegungen bis auf die nach oben Innenseite vollständig aufgehoben; die Spannung normal, die Pupille dilatirt und unbeweglich, die brechenden Medien klar, den Hintergrund roth, die Papille atrophisch; Sausen im rechten Ohre, habituelle Kopfschmerzen. Der bulbus lässt sich leicht reponiren, man fühlt keinen tumor in der orbita.

Am 22. April 1870 stellte sich die P. wieder vor. Man fand den Augapfel ganz aus der Augenhöhle herausgetreten und fühlte hinter dem bulbus einen grossen tumor, welcher seinen Sitz im opticus oder dessen Neurilem zu haben schien.

Nach der Enucleatio bulbi sah man den Sehnerv in einer gelatinösen, etwas gelbliche Geschwulstmasse eingelagert, welche so rein als möglich aus der orbita entfernt wurde, an welcher sie fest ansass. Demnach vermuthete man schon damals: „probablement la dégénérescence myxomateuse avait déjà envahi la portion intracranienne du nerf.“

Die microscopische Untersuchung, welche von M. Manfredi²⁾ vorgenommen wurde, ergab: „La structure est ce

¹⁾ Annali di ottalmologia 1871, mitgetheilt in Annales d'oculistique Tome LXV. 1871 pg. 252.

²⁾ Annales d'oculistique. Tome LXVIII. 1872 pg. 71.

une myxôme, à cellules volumineuses, rondes, fusiformes ou oïlées, munies alors de prolongements considérables“. Einige Zeit nach der Operation trat eine Entzündung des orbitalen Zellgewebes ein nebst nervösen Erscheinungen an der rechten Körperhälfte. Im August traten äusserst heftige Kopfschmerzen auf; am 10. October erfolgte unter Delirien und Convulsionen der Tod. Leider wurde die Obduction verweigert.

Der Verein jüngerer Aerzte in Zürich hat im Corresp. bl. f. Schweizer Aerzte 1873 pg. 198¹⁾ einen Fall von Myxosarcoma n. optici erwähnt, welchen Horner beobachtet hat. Wie gewöhnlich war der Exophthalmus genau in der Richtung der Bulbusaxe erfolgt und hatte keine sehr bedeutende Entwicklung erreicht; die Beweglichkeit des bulbus war erhalten, das Sehvermögen schon sehr früh aufgehoben. Die Neubildung ging von der Scheide des Nerven aus und hatte den Stamm des letzteren comprimirt.

Ein Fibroma myxomatodes des Sehnerven beschreibt Dr. Goldzieher in Gräfe's Archiv 1873 XIX. 3. pg. 125 u. flgd., welches Prof. Becker bei einem 10jährigen Knaben extirpirt hat.

Das grösste Myxom, welches wol je am Sehnerven beobachtet worden ist, beschreibt Prof. A. Rothmund jun.²⁾ in München. Wie ungenau übrigens damals kurz vor dem Erscheinen von Virchow's: „die krankhaften Geschwülste“ die Bezeichnungen noch waren, geht daraus hervor, dass Rothmund in der Ueberschrift sagt: „Neurom (cystoese Degeneration) des Sehnerven“ und erst schliesslich erwähnt: „Die microscopische Untersuchung wies die Bestandtheile eines Myxomes dar, wie es an andern Nerven oft beobachtet wird.“

In der Krankengeschichte erzählt er, dass am 19. Juni 1862 ein 17jähriges Mädchen in seine Klinik kam, aus deren linker Augenhöhle eine enorme Geschwulst hervorgewuchert war. Die Neubildung war grösser als ein Hühnerei und konnte von der Patientin willkürlich mit den Augenmuskeln hin und her bewegt werden, trotzdem sie 15 Jahre lang

1) Angeführt in Nagel's Jahresbericht 1873 pg. 328.

2) Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde v. Zehender 1863 pg. 261. Derselbe Fall ist angeführt in: Annales d'oculistique. Tome LI. 1864 pg. 108.

bestand. Die Operation glich einer einfachen Enucleatio bulbi. Die von Prof. Dr. Buhl untersuchte Geschwulst zeigte vorwiegend Rudimente des bulbus, nämlich cornea und sclera: Linse und Glaskörper waren resorbirt. Die eigentliche Geschwulstmasse bestand aus dem degenerirten opticus, welcher rückwärts noch ca. 3''' hervorragte. Die ganze Neubildung bestand aus grösseren und kleineren Cysten; die microscopische Untersuchung ergab, wie schon erwähnt, ein Myxom.

Was den weiteren Krankheitsverlauf anbetrifft, so füllte sich die enorm vergrösserte orbita ziemlich schnell mit Granulationen, so dass P. schon nach einigen Wochen entlassen wurde.

II. Die Carcinome, Sarcome, Gliome, Psammome.

Diese können sowohl von der eigentlichen Nervensubstanz als auch von der Nervenscheide ausgehen. „Zimmerman statuit, posse nasci (sc. cancer orbitae) e nervi optici aut centrali parte aut e peripherica. . . . — Ex XLVIII. morborum historiis, Gunther, quae ex diversis autoribus congregavi saepissime nervum opticum focum mali fuisse elucet.“¹⁾

Eine ganze Reihe von Carcinomen des opticus führt Demarquay²⁾ an; Schöffner hat einen Fall von carcinomatöser Entartung des Sehnerven mitgetheilt.³⁾

Scarpa, Wardrop, Saunders, Maunoir, Shayer, Eliason, Panizza haben dasselbe beobachtet; ebenso haben Middlemore und M. Roux ähnliche Beobachtungen gesammelt.

In den Schmidt'schen Jahrbüchern⁴⁾ findet sich ein tumor erwähnt, welcher von der Substanz des Sehnerven ausgegangen war, so dass das Neurilem die äussere Hülle der Geschwulst bildete. Diesen Fall führt Demarquay ebenfalls unter den Carcinomen an, ohne dass es festgestellt ist, welche Natur dieser tumor war.

¹⁾ Recueil de thèses allemandes; Mühry A. A. De parasitorum malignorum imprimis ad fungi medullaris oculi historiam symbola aliquot. Diss. Götting. 1833.

²⁾ Demarquay. Traité des tumeurs de l'orbite pg. 506.

³⁾ Recueil de thèses allemandes, Schöffner.

⁴⁾ Schmidt's Jahrbücher Bd. I. pg. 352.

Lebert¹⁾ hat unter 23 Fällen von Krebs 7 beobachtet, welche in der orbita ihren Ursprung nahmen, 5 vom Sehnerven.

Schott²⁾ hat in einem Fall Eucleatio bulbi gemacht, „où un fungus hématode formait dans le nerf optique une tumeur aussi grosse, qu'un oeuf de poule, à partir du trou optique jusqu'à un pouce du globe de l'oeil.“

In einigen Fällen wird direct angeführt, dass das Carcinom vom Neurilem ausgegangen sei. So führt Demarquay unter tumeurs cancéreuses du nerf optique an: „Dans le musée de L. Heaviside, dit Wardrop, il y a une préparation du nerf optique d'un oeil amaurotique, dans lequel une tumeur d'un volume considérable s'élève du neurilème.“³⁾ Auch bei dieser Beobachtung ist weder hier noch von Mackenzie erwähnt, dass der tumor ein Carcinom gewesen (das Original war mir nicht zugänglich), so dass es zweifelhaft erscheint, ob man diesen Fall hierher rechnen kann. Dagegen sagt Demarquay weiter ausdrücklich: „Dans un cas observé par Middlemore, la tumeur squirrheuse avait pris naissance dans la gaine du nerf optique“⁴⁾ und Mackenzie (frz. übersetzt v. Warlomont pg. 485 erwähnt: „on l'a (sc. fungus hématode) même vu occuper la gaine, que ce nerf reçoit de la dure — mère sans que la substance du nerf lui — même fût affectée“.

Voigtel führt in seiner path. Anatomie im I. Bd. an: Ferner wird erzählt, dass nach Ausrottung eines krebshaften Auges ein Sehnerv vorgefunden wurde, der fest an das foramen opticum angewachsen und in einen festen Schwamm verwandelt war. Wagner rottete ebenfalls ein 18 Loth schweres, aus einem blassrothen, festschwammigen, mit mehreren Blutgefässen versehenen Fleische bestehendes Schwammgewächs aus.“

In folgendem sehr genau beobachteten Fall von v. Szokalski

¹⁾ Lebert, Maladies cancéreuses pg. 841.

²⁾ Controverse über die Nerven des Nabelstrangs (avertissement à la fin) 1836. — Voir encore Edinburg medical and surgical Journal t. XI. pg. 274 1833. Ausserdem findet sich derselbe Fall angeführt in Mackenzie: Traité pratique des maladies de l'oeil (franz. Uebers. von Warlomont).

³⁾ Wardrop, Essays on the morbid anatomy of the human eye t. II. Derselbe Fall wird angeführt in Mackenzie t. II. p. 799.

⁴⁾ Gazette médicale 1838.

in Warschau¹⁾ war der Ursprung des Carcinoms das Neurilem des opticus. Bei einem 4jährigen Kinde war in Folge einer heftigen Contusion des linken Auges im Laufe von ca. 12 Monaten ein bedeutender Exophthalmus entstanden, ohne dass bis dahin das Sehvermögen aufgehoben war. Einige Zeit darauf traten intermittirende Schmerzen auf, die sehr bald an Heftigkeit zunahmen, während die Prominenz des Bulbus immer bedeutender wurde. Bald zeigten sich nicht nur Entzündungserscheinungen am linken Auge, die allmählig zur Erblindung führten, sondern es trat auch sympathische Reizung des rechten Auges auf. Nachdem der Bulbus nebst dem dahinter befindlichen Tumor extirpirt war, fand man bei der microscopischen Untersuchung der Geschwulst den charakteristischen Typus des Carcinoms und ausserdem noch dazwischen zerstreute Nervenfasern, welche sich bogenförmig nach dem opticus hinzogen. Nach 5 Jahren bekam die Kleine ein Recidiv, welches operirt wurde, worauf sie am 6. Tage an Meningitis starb.

Endlich führt Demarquay noch einen Fall von cancer gélatiniforme an: Bei einem 13jährigen Kinde, welches seit 4 Jahren an beträchtlichem Exophthalmus des einen Auges mit aufgehobenem Sehvermögen litt, wurde mit dem Bulbus ein Tumor enucleirt „sphéroïdale, rougeâtre, lisse dans toute sa surface et embrassant le nerf optique, qui est perdu dans son épaisseur.“²⁾ Die darauf folgende pathologisch anatomische Beschreibung ist zwar nicht sehr genau, lässt aber zu Noth die Deutung eines carcinoma medullare zu.

Ueber ein Sarcom des Sehnerven von Wallnussgrösse, welches Dr. Berlin in Stuttgart bei einem 4jährigen Kinde operirt hat, giebt Dr. Goldzieher eine sehr genaue Beschreibung nebst Abbildungen in Graefe's Archiv 1873. XIX. 3. pg. 13.

Ebendasselbst pg. 134 beschreibt er ein Gliom des opticus von Dr. Berlin bei einem 4 $\frac{1}{2}$ jährigen Kinde extirpirt.

Einen Fall von Gliosareom, welchen M. Jeffries Joy aus Boston in der amerikanischen ophthalmologischen Gesellschaft

1) Annales d'oculistique 1861. t. XLVI. 8^e. série T. 6 pg. 43.

2) Bulletin de Thérapeutique 1844 LXXVII. pg 25.

mitgetheilt hat¹⁾ will ich nur kurz anführen, da mir aus der Krankengeschichte sowohl, als aus dem anatomischen Befund hervorzugehen scheint, dass der tumor seinen primären Sitz in der Ciliargegend gehabt habe und erst von da aus auf den opticus übergegangen sei.

Schliesslich will ich hier noch den einzeln dastehenden Fall eines Psammom's des opticus anreihen, welchen Prof. Neumann in Königsberg im XIII. Jahrg. des Archiv's für Heilkunde veröffentlicht hat. Es handelt sich um eine wall- und aussgrosse Sehnervengeschwulst, welche J. Jacobson bei einem 10-jährigen Mädchen entfernt hatte und welche, wie Jacobson uns in einem Colleg mittheilte, „den ganzen Sehnerven in der Orbita einhüllte, ohne die geringste microscopisch wahrnehmbare Veränderung an ihm hervorzurufen und ohne seine Centralgefässe zu comprimiren und bei welcher dennoch ausgesprochenste Neuritis papillae mit gutem Sehvermögen vorhanden war.“

III. Die Cysten und Hydatiden.

Unter einer dieser Bezeichnungen sind in der Literatur Fälle angeführt, von denen es nach unsern jetzigen Begriffen zweifelhaft ist, ob wir sie nicht theilweise zu den Myxomen zu rechnen haben. So führt Demarquay²⁾ an, dass M. Wolf³⁾ „une kyste colloïde ovale, rempli d'un liquide gélatineux“ beobachtet habe, welche mit dem Neurilem des opticus und mit den Muskeln des Auges innig zusammenhing. Ueber die genauere Structur dieses tumors, sowie über seinen muthmasslichen Ausgangspunkt werden wir nicht aufgeklärt.

Derselbe Autor erwähnt, dass Morgagni ein Mal auf einer kurzen Strecke des Sehnerven anstatt Nervensubstanz „une tumeur cendrée, trouble visqueuse“ gefunden hätte. Diese Beschreibung ist noch unklarer, als die vorige.

Ebensowenig ist es mir verständlich, was Ruete⁴⁾ darunter

1) Annales d'oculistique Tome LXV 1871. pg. 266. Derselbe Fall ist angeführt in: Zehender klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. 1871. pg. 59.

2) Demarquay: Tumeurs de l'orbite pg. 395 und 503.

3) Annales d'oculistique 1857 p. 102.

4) Ruete: „Lehrbuch der Ophthalmologie“ pag. 603.

meint, wenn er in seinem Lehrbuche behauptet, „dass Atherom in der Scheide der Sehnerven vorkommen.“

In der path. Anatomie von Voigtel 1804 finden wir folgendes¹⁾: „Paw fand an dem Sehnerv eine grosse Wasserblase, durch deren Druck ein schwarzer Staar entstanden war.“

Endlich führt Arlt²⁾ an, dass Beer in 3 Fällen Hydatide zwischen den Scheiden des Sehnerven gefunden und dass von deren Vorkommen auch andere Beobachter sprächen.

Im Anschluss an die Cysten will ich einen Fall anführen, welchen Prof. Manz als Hydrops vaginae nervi optici beschreibt³⁾. Bei einem 16jährigen jungen Mann, der Folge eines Gehirnleidens gestorben war, fand man verbreitete Tuberculose und in den ausgedehnten Hirnhöhlen einen ziemlichen Wassergehalt. Die Sehnerven waren um das doppelte bis dreifache verdickt durch eine enorme Ausdehnung ihrer Scheide; diese fand sich in einen prall gehüllten Sack verwandelt, der mit einer klaren wässrigen Flüssigkeit gefüllt war. Den grössten Umfang hatte dieser Sack zunächst am Bulbus. Aehnliche Befunde hat v. Ammon⁴⁾ mitgetheilt.

IV. Die Tuberkel.

Wir finden nicht nur fast in allen Lehrbüchern angeführt, dass Tuberkel in und an den Sehnerven vorkommen, sondern wir finden auch in der Literatur nicht gerade selten Fälle derart beschrieben. So erwähnt Demarquay⁵⁾ einen von Demours⁶⁾ beobachteten Tuberkel: „Je trouvai dans le milieu de son corps (sc. du nerf optique) un petit tubercule d'une consistance assez dure, d'une couleur grisâtre et un peu plus gros qu'un grain de chènevis;“ so auch erzählt er⁷⁾, dass Jules Roux in 1 Fall gefunden hätte: „L'oeil atrophié est c...

¹⁾ Graefe's Archiv 1873. XIX. 3. pg. 119.

²⁾ Arlt: „Die Krankheiten des Auges“ 3. pg. 143.

³⁾ Zehender: „Klinische Monatsblätter f. Augenheilkunde“ 1866 pg. 281.

⁴⁾ Arch. f. Ophthalmologie VI. Bd. Abth. 1. pg. 15—17.

⁵⁾ Demarquay: Tumeurs de l'orbite pg. 504.

⁶⁾ Demours, Traité des maladies des yeux. t. 1. pg. 75. Denselben Fall erwähnt Arlt in seinem Lehrbuch III. pg. 143.

⁷⁾ Demarquay pg. 497.

partie confondu dans une masse tuberculeuse, qui pénètre la sclérotique et le nerf optique“, wobei freilich der Ausgangspunkt im bulbus selbst gelegen zu haben scheint, aber diese und ähnliche Beschreibungen scheinen kaum zu den wirklichen Tuberkeln im heutigen Sinne zu gehören und werden wol am besten durch folgenden Ausspruch Virchow's¹⁾ characterisirt: „Nur warne ich davor, diese Tubercula nervorum selbst als Nerven-Tuberculose aufzufassen, von der bis jetzt kein sicheres Beispiel vorliegt. Nur der Anschein einer solchen kann dadurch entstehen, dass käsige Drüsen mit Nerven verachsen.“

V. Die Aneurysmen der a. centralis retinae.

Sie haben mit den eigentlichen Tumoren des Sehnerven das gemein, dass sie durch Compression der Nervenfasern eine Hemmung der Leitung bewirken und dass sie je nach ihrer Grösse den bulbus mehr oder minder aus der orbita herausdrängen. Die Diagnose ist in vorgeschrittenen Fällen, in denen der Patient selbst oder wenigstens der Beobachter die Pulsationen fühlt, leicht zu stellen.

Der bekannteste Fall eines Aneurysma der a. centralis ist der von der badischen Prinzessin, beschrieben im Dictionnaire des sciences médicales (t. XXXV. pg. 20. Paris 1819), welcher von mehreren Autoren²⁾ angeführt wird. Darnach besitzt der Prof. Schmidler zu Freiburg, wie es heisst, ein ebenso seltenes als curioses pathol. anatomisches Präparat. Es ist dies ein Aneurysma der a. a. centrales beider Augen einer badischen Prinzessin, welche seit längerer Zeit blind war und die bedeutendsten deutschen Chirurgen consultirt hatte. Sie sah nur in wenig, wenn sie nach unten blickte, indem die Aneurysmen den opticus comprimierten.

Graefe der Vater³⁾ erzählt einen ähnlichen Fall, welchen

¹⁾ Virchow: „Die krankhaften Geschwülste“ III. pg. 280.

²⁾ So von Mackenzie (frz. Uebers. v. Warlomont): *Maladies de l'oeil* II. pg. 799. — Arlt: *Krankheiten des Auges* III. pg. 143. — Demarquay: *Tumeurs de l'orbite*. pg. 295.

³⁾ Angiectasie pg. 32. Leipzig 1808. Angeführt ist dieser Fall auch v. Mackenzie II. pg. 799 und Demarquay pg. 295.

Langenbeck so citirt: „In femina, inter photophobiam pulsationis in orbita sensum occaecata, arteriam centralem canale nervi optici ad lumen straminis ambitam, distentam retinae angiectasia observavit.“

Ein kleines Aneurysma der a. centralis soll auch, w Velpeau¹⁾ erzählt, Astley Cooper beobachtet haben.

Mackenzie²⁾ führt eine ganze Reihe von Fällen an. Nach ihm hat M. Guthrie³⁾ einmal an beiden a. a. Aneurysmen diagnosticirt und durch die Section bestätigt gefunden. In anderen Fällen ist durch Unterbindung der a. carotis commun. Heilung erzielt worden, entweder mit Erhaltung des Sehvermögens oder ohne dieses. So hat M. Busk⁴⁾ in einem nach Trauma entstandenen Fall durch die Ligatur vollständige Heilung erzielt, ebenso der Prof. Dudley in Lexington⁵⁾. M. Scott hingegen hat nach derselben Operation zwar das Aneurysma zum Schwinden gebracht, das Sehvermögen jedoch blieb verloren. M. Curling hat darnach einmal eine Abnahme der Sehschärfe beobachtet. Endlich erwähnt Mackenzie noch eine Heilung durch Einspritzungen einer Lösung von ferrosesquichlorat, ausgeführt von Bourguet⁶⁾ bei einem 12 1/2 jährigen Mädchen, nachdem einige Versuche mit Galvanopunctur ein absolut negatives Resultat ergeben hatten. Schon nach der 2. Injection soll das Aneurysma fester, dann kleiner geworden sein und allmählig schwand es vollständig, während die Sehschärfe normal blieb.

VI. Unbestimmte Geschwülste.

Man findet in der Literatur eine Anzahl von Opticengeschwülsten so kurz und ungenau beschrieben, dass man unmöglich daraus ersehen kann, unter welche Categorie sie zu gruppiren sind. Ich will mich daher beschränken, Fälle dieser

1) Medecine opératoire 2e édition. t. II. pg. 212

2) Mackenzie (frz. Uebers. v. Warlomont) I. pg. 488—493.

3) Lectures on the operative Surgery of the Eye p. 158. London 1853.

4) Medico-Chirurgical Transactions vol. XXII, p. 124. London 1853.

5) American Journal of the Medical Sciences, January 1843 p. 17.

6) Bourguet. Académie des sciences de Paris séance du 19. nov. 1855. — Gazette médicale de Paris 1855, pg. 772.

rt, welche mir aufgestossen sind, nur der Vollständigkeit wegen hier hintereinander aufzureihen:

Mackenzie I. pg. 480. Obs. 286.

Ophthalmic Hospital Reports 1869. Volume six. pg. 295.

Demarquay: „Tumeurs de l'orbite“ pg. 494.

Ibid. pg. 504: „Tumeurs de la gaine du nerf optique“, ein von Ferro beobachteter Fall.

Ibid. pg. 503 ist erwähnt, dass Walter und Morgagni Kalkablagerungen im Sehnerven gefunden hätten.

In Voigtel's pathol. Anatomie 1804 steht: „Wandler fand bei einem jungen Menschen, welcher den schwarzen Staar gehabt hatte, einige harte Geschwülste am Sehnerven. Man fand auch eine kropfartige Beule am Ursprunge dieses Nerven.“

Herrn Dr. Schneller, welcher in seiner Uneigennützigkeit mir nicht nur die Beschreibung obigen Falles überlassen, sondern auch in liberalster Weise seine reichhaltige Bibliothek zur Verfügung gestellt hat, so wie Herrn Dr. Perls, der es mir erlaubte, das Resultat seiner höchst sorgfältigen pathol. anatomischen Untersuchung meiner Arbeit einzuverleiben, sage ich hiermit meinen herzlichsten Dank.

Thesen.

I.

Das Epithel an der innern Hornhautoberfläche ist Endothel analog der Innenseite der Lymphgefäße.

II.

Bei Anwendung der Esmarch'schen unblutigen Operationmethode ist auf die Gefahr der Nachblutung besondere Rücksicht zu nehmen.

III.

Allgemeine hygieinische Massregeln sind im Stande, die Mortalitätsziffer herabzudrücken.

Lebenslauf.



Rudolf Loch geboren am 22. December 1848 zu Willenberg. Von Ostern 1861 bis Ostern 1867 besuchte ich das altstädtische Gymnasium zu Königsberg; von Ostern 1867 bis Ostern 1872 studirte ich auf der dortigen Albertus-Universität Medicin und absolvirte am 17. Juni 1872 das Staatsexamen. Während meiner Studienzeit habe ich die Vorlesungen und Kliniken folgender Herren besucht:

Prof. Dr. Burdach, Prof. Dr. Caspary, Prof. Dr. Moser, Prof. Dr. A. Müller, Prof. Dr. Goltz, Prof. Dr. v. Wittich, Prof. Dr. Werther, Dr. Gruenhagen, Prof. Dr. Leyden, Prof. Dr. Neumann, Dr. Berthold, Dr. Jaffé, Dr. Schneider, Prof. Dr. H. Jacobson, Dr. Seydel, Prof. Dr. Hildebrandt, Prof. Dr. Wagner, Dr. Caspary, Prof. Dr. Schoenborn, Dr. v. Hippel, Prof. Dr. J. Jacobson.

Allen diesen Herren sage ich hiemit meinen aufrichtigen Dank.



